

1
2
3

Animal Industry and Technology(축산기술과 산업) TITLE PAGE

Upload this completed form to website with submission

ARTICLE INFORMATION	Fill in information in each box below
Article Type	Review article
Article Title (English; within 20 words without abbreviations)	Effective methane mitigation strategies in ruminants
Article Title (Korean; English paper can be omitted)	반추가축의 메탄 저감 방안
Running Title (English; within 10 words)	Livestock and methane
Author (English)	A-Rang Son, Sang-Suk Lee
Affiliation (English)	Department of Animal Science and Technology, Suncheon National University, Suncheon 57922, Korea
Author (Korean; English paper can be omitted)	손아랑, 이상석
Affiliation (Korean; English paper can be omitted)	국립순천대학교, 동물자원과학과
ORCID (for more information, please visit https://orcid.org)	A-Rang Son (https://orcid.org/0000-0002-3896-0950) Sang-Suk Lee (https://orcid.org/0000-0003-1540-7041)
Competing interests	No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
Funding sources State funding sources (grants, funding sources, equipment, and supplies). Include name and number of grant if available.	본 논문은 농림식품기술기획평가원의 지원(RS-2023-00231662)에 의해 수행되었습니다.
Acknowledgements	Not applicable.
Availability of data and material	Upon reasonable request, the datasets of this study can be available from the corresponding author.
Authors' contributions Please specify the authors' role using this form.	Conceptualization: Lee SS. Data curation: Lee SS. Formal analysis: Lee SS Methodology: Lee SS Software: Lee SS. Validation: Son AR, Lee SS. Investigation: Son AR, Lee SS. Writing - original draft: Lee SS Writing - review & editing: Son AR, Lee SS
Ethics approval and consent to participate	This article does not require IRB/IACUC approval because there are no human and animal participants.

4

5 CORRESPONDING AUTHOR CONTACT INFORMATION

For the corresponding author (responsible for correspondence, proofreading, and reprints)	Fill in information in each box below

First name, middle initial, last name	Sang-Suk Lee*
Email address – this is where your proofs will be sent	rumen@scnu.ac.kr
Secondary Email address	rumen@sunchon.ac.kr
Address	Ruminant Nutrition and Anaerobe Laboratory, Department of Animal Science and Technology, Sunchon National University, Suncheon 57922, Korea
Cell phone number	+8210-2776-1187
Office phone number	+82-61-750-3237
Fax number	+82-61-750-3237

6
7

ACCEPTED

8 **Abstract**

9 Driven by growing concerns about climate change, the government and the public are increasingly
10 focused on understanding rumen methanogenesis in livestock. This paper aimed to review the strategies
11 to reduce enteric methane (CH₄) emissions from ruminants, which is a major contributor to greenhouse
12 gases (GHGs). We explored diverse approaches from natural plant additives to chemical additives (e.g. 3-
13 NOP, monensin, nitrate, etc.) as well as animal breeding techniques to methane emissions from ruminants.
14 Research and development of methane inhibitors have primarily focused on two approaches: targeting
15 methanogenic archaea in the rumen and enhancing hydrogen utilization within the rumen. The
16 development of methane mitigation technologies has gained significant attention as a promising approach
17 to reducing greenhouse gas emissions from livestock. However, concerns regarding the potential impact
18 of these technologies on the health of both animals and humans require a comprehensive safety
19 assessment such as phased toxicity studies and defined usage criteria and restrictions. Addressing
20 methane emissions from ruminants poses a pressing challenge that requires a multifaceted approach. To
21 achieve effective methane reduction, a combination of technologies must be implemented. Furthermore,
22 collaboration among researchers, livestock farmers, and feed companies is essential to guaranteeing safe,
23 sustainable, and environmentally friendly livestock production.

24 **Keywords :** Ruminants, Greenhouse gas, Methane mitigation, Rumen methanogens

25

26

27

서론

28 가축에 첨가하는 다양한 보조사료는 국가가 제정한 법령에 의해 규제를 받게 된다. 이는
29 사료를 섭취하는 가축의 안전 및 이를 제조하거나 취급하는 근로자 및 동물성 식품을 섭취하는
30 인간과 환경에 안전성을 보증해야 하기 때문이다. 사료관리법은 사료의 품질관리와 안전성
31 확보 등에 필요한 동물의 범위 및 사료의 범위와 명칭, 유해물질의 함량, 표준 분석 방법 등을
32 포함하고 있다. 2023년 10월 농림축산식품부에서는 사료의 기준 및 규격에 단미사료와
33 보조사료 외에 메탄저감제의 기준을 새롭게 설정하였다. 메탄저감제란 단미사료 및 보조사료로
34 기준 및 규격이 설정된 물질 중 가축 장내발효로 발생하는 메탄을 10% 이상 감축할 수 있는
35 제품으로 한정하고 있다. 또한 저메탄사료는 메탄 저감제를 가축의 성장단계에 따라 급여량에
36 맞게 첨가한 사료를 말한다[1]. 국내에서 사용 가능한 메탄저감제는 정량분석을 통하여 품질
37 관리가 가능하면서, 가축의 건강 및 생산성에 유의적인 저하 및 안전성에 영향을 미치지 않는
38 사료이어야 한다. 이와 같이 탄소 중립의 일환으로 축산 분야 저메탄사료의 보급을 위한 정책이
39 활성화 되면서, 온실가스 배출량을 감축시킬 수 있는 환경 친화적인 사료 개발 및 생산이
40 활발히 진행되고 있다.

41 메탄(CH_4)은 식물성 사료를 소화하는 한우, 젖소, 염소와 같은 반추가축의 주요 장기인
42 반추위의 미생물에 의해 생성된다. 반추가축 사료의 주요 구성성분인 섬유질은 반추위내
43 미생물에 의해 분해되어 휘발성지방산과 메탄을 생성한다. 대부분의 메탄은 반추위내 고세균인
44 메탄생성균에 의해 발효과정에서 생성된 수소 가스의 일부를 이용하여 발생 된다. 이렇게
45 반추가축에서 생성된 메탄은 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on
46 Climate Change, IPCC) 제 6차 평가보고서(AR6)에 따르면 100년 기준으로
47 이산화탄소(CO_2)보다 약 25배 정도 더 강력한 지구 온난화 효과를 가지고 있는 것으로
48 보고되고 있다[2].

49 메탄은 대기 중에 오래 머무르지 않고 빠르게 분해되지만, 분해되기 전에 기체와 액체 상태로
50 존재하며 온실 효과를 발생시킨다. 또한 오존층을 파괴하는 전구체로서 질소 산화물과 같은
51 물질과 반응하여 광화학 스모그를 형성하여 산성비, 식물 피해 등 환경 문제를 야기시킬 수
52 있다. 이외에도 다양한 농업 생산성에 영향을 미치며, 이는 사회 및 경제적 비용 상승을 가져올
53 수 있다. 따라서 메탄 배출량 감축은 미래 환경을 보존하는 필수적인 조건으로, 이러한 문제를
54 해결하기 위해 다양한 조치가 필요하다고 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 저탄소 축산업을
55 위한 방안으로 반추가축에서 발생하는 메탄 배출량 및 감축 방안을 모색하고, 감축 기술을 농가
56 현장에 적용할 수 있는 방안을 검토하는데 있다. 특히 현재까지 이용 가능한 메탄저감제의 특성
57 및 저감 효과에 대한 수용 가능성을 구체화 하고자 하며, 이를 통해 지속 가능한 반추가축 생산
58 방안을 채택하여 환경 보호와 경제적인 이익을 동시에 추구하고자 한다.

59

60

국내 반추 가축 메탄 배출 현황

61 환경부에서는 축산 부문에서 발생하는 메탄 배출량을 산정하여 매년 국가 온실가스 인벤토리
62 보고서를 발간하는데, 축산 부문에서 발생하는 주요 온실가스인 메탄은 반추가축의 소화기관내
63 발효에 의해 발생하는 장내 발효와, 가축 분뇨의 혐기적 분해 과정에서 발생된다고 한다. 이때
64 온실가스의 영향력을 결정하는 지구 온난화지수(GWP, Global Warming Potential)는
65 온실가스별 배출량을 비교 및 관리하는데 중요한 지표로서, 메탄의 경우 지구 온난화에 미치는
66 영향을 이산화탄소와 비교하여 수치화 시킨다. IPCC 제 6차 평가보고서에 따르면, 메탄의 지구
67 온난화지수는 100년을 기준으로 이산화탄소보다 28배, 20년을 기준으로 84배 더 높은 온난화
68 효과를 가지는 것으로 계산되었다. 또한 2023년 국가 온실가스 인벤토리 보고서에 적용되는
69 장내발효에 의한 메탄 배출량은 2022년까지 산정하였던 1996년 IPCC 기본 배출계수를
70 적용하지 않고, 2006년 IPCC 기본배출계수를 적용하였으며 국가 고유 배출계수가 있을
71 경우에는 국가 고유 배출계수를 적용하는 것으로 변경되었다(Table 1).

72 2021년 농업분야 온실가스 배출량은 국가 총 배출량의 3.2%인 21.4백만톤(CO₂eq)으로
73 전년대비 1.1% 증가하였으며, 축산 부문은 10.8백만톤으로 전체 농업분야의 45%를 차지하고
74 있다. 이때 장내 발효에 의한 배출량은 4.9백만톤으로 20년 대비 3.5% 증가하였으며, 가축분뇨
75 처리부문에서도 5.4백만톤으로 4.2% 증가하였다[3]. 메탄 배출량 증가는 국내 한·육우 사육
76 두수의 증가가 주요 요인으로 2024년 2월 한·육우의 사육 두수는 3,872,877두로 전년
77 3,975,966두에 비해 2.3% 감소하였으나, 지속적인 사육두수의 증가에 기인하고 있다. 한·육우의
78 장내 발효에 의한 메탄 배출량은 전체 축종별 배출량의 67.7%로 가장 많으며, 다음으로
79 젓소(21.3%), 돼지(7.4%), 양과 염소 순으로 배출되었다.

80 2018년 대비 2030년 온실가스 배출량 40% 감축을 목표로한 국가 온실가스 감축 목표
81 사항안이 2023년 8월 확정되었으며, 농·축산 부문의 감축량은 2018년 목표대비 11.9% 감축한
82 27.1% 감축을 목표로 설정하였다. 축산 부문 온실가스 감축을 위해 정부에서는 장내발효
83 부문에서 2030년까지 저메탄사료 30% 보급, 저단백사료 및 생산성 향상을 통해 447.1만톤
84 CO₂eq 에서 370.2만톤으로 76.9만톤 감축과 가축분뇨 처리 개선을 통해90만톤 CO₂eq 감축을
85 계획하고 있다.

86

87 반추가축의 메탄 생성 과정

88 반추위내 메탄 생성

89 반추위에는 사료를 분해하는 다양한 미생물들이 서식하고 있으며, 이 미생물 중 일부는
90 고세균(고균)으로 존재하며 수소를 전자 공여체로 사용하는 균과 암모니아산화 및 황을 전자
91 수용체로 사용하는 균류가 많이 존재한다. 고세균은 크게 다섯개의 고세균 문(phyla)로 분류할
92 수 있으며, 주요 미생물문으로는 *Euryarchaeota*, *Crenarchaeota*, *Thaumarchaeota*,
93 *Koraarchaeota* 및 *Nanoarchaeota* 로서 많은 양의 메탄을 생성하는 균들은 *Euryarchaeota* 에
94 포함된다. 대부분의 메탄 생성균(methanogens)은 산소가 있는 곳에서는 생존하기 어려운 절대

95 혐기성 균들로, 혐기적 환경 조건에서 이산화탄소를 최종 전자 수용체로 사용하며 수소를
96 전자공여체로 하여 메탄으로 환원된다. 반추위내 사료가 메탄으로 전환하기 위해서는 전구
97 물질인 수소 및 이산화탄소를 공급할 수 있으면서, 영양 대사를 같이 진행할 수 있는
98 공생미생물들이 있어야 한다. 반추위내 섬유소를 분해하는 다양한 공생미생물은
99 가수분해과정을 통해 최종 산물인 휘발성지방산, 젖산, 알코올, 메탄올, 수소 및 이산화탄소
100 등으로 전환이 된다. 반추위내 메탄생성은 이산화탄소 환원 경로와 메탄올이나 메틸아민계통의
101 메틸영양물질을 이용하는 경로, 아세트산을 이용하여 생성하는 경로로 구분된다. 일반적으로
102 이산화탄소가 메탄으로 환원되는데 필요한 전자로 많은 고세균들이 수소를 이용하며, 반추위내
103 미생물의 발효과정에서 생성된 이산화탄소는 메탄생성균에 의해 7단계의 메탄생성과정을 통해
104 메탄으로 환원된다. 이 과정 가운데 여러 특정 효소들이 작용하여 이산화탄소가 메틸기로
105 환원이 되고 환원된 메틸기는 메틸전이효소에 의해 CoM 을 함유한 메틸-CoM 으로 전환되며
106 다시 메틸 환원효소에 의해 메탄으로 환원이 된다.

107 반추가축에 의한 메탄은 출생후 4주부터 반추위에서 발생되며, 반추위가 성장하면서
108 급격하게 증가한다[4]. 메탄생성에 의한 총에너지의 손실은 2-12%로 사료의 소화율에 따라
109 변동성을 지니며, 탄수화물 발효 속도와 통과율에 의해 영향을 받기도 한다. 또한
110 휘발성지방산에 초산과 프로피온산의 생성 비율(0.9-4.0)에 따라 메탄 발생량은 차이를 보인다.
111 2018년 INRA 의 분석결과에 따르면 총에너지의 손실은 분에서 33.3%, 메탄 6.3% 뇨 3.9%로
112 결과적으로 56.4%의 대사에너지가 생성되는 것으로 보고되고 있다. 그러나 장내 메탄생성을
113 억제하는 것으로 가축의 에너지 대사가 향상되거나, 사료의 효율을 높일 수 있을 것으로
114 예측하기는 어렵다[5,6].

115

116 반추위내 메탄 생성균의 종류

117 반추위에는 다양한 미생물 군이 존재하며, 주요 미생물 군집으로는 혐기성 박테리아, 혐기성
118 곰팡이, 프로토조아 및 고세균이 서식하고 있다. 프로토조아는 전체 반추위 바이오매스의
119 절반을 차지하고 있으며 곰팡이는 약 8%, 나머지 부분은 박테리아가 차지하는 것으로 추정하고
120 있다[7]. 이중 주요 박테리아문은 Firmicutes, Bacteroidetes 및 Proteobacteria 가 가장 풍부하며,
121 수소를 만들어내는 박테리아는 *Ruminococcus* 및 Firmicutes 를 포함하는 *Eubacterium spp.* 등이
122 존재한다. 미생물 군집 분석을 통해 메탄 생성량이 낮은 동물은 프로피온산을 생산하는
123 *Quinella ovalis*, 수소를 생산하지 않는 *Fibrobacter spp*, *Kandleria vitulina* 및 *Prevotella*
124 *bryantii* 의 상대적 풍부도가 높으며, 메탄 발생량이 많은 형은 *Ruminococcus*,
125 *Ruminococcaceae*, *Lachnospiraceae* 및 *Clostridiales* 등의 상대적 풍부도가 높게 보고되었다[8].
126 앞서 설명한 대로 반추위 메탄 생성균은 반추위내 존재하는 다양한 미생물에 의해 사료의
127 발효과정에서 나온 수소 및 이산화탄소를 이용하여 메탄을 생성하며, 반추위내 박테리아,
128 프로토조아 및 곰팡이 등의 상호작용을 통해 고세균의 성장과 메탄생성량은 달라질 수 있다.
129 미생물에서 발견되는 16S 리보솜 RNA 분석은 최근 미생물의 군집 분석에 많이 이용되며,
130 이러한 분석에 의하면 반추위의 고세균은 전체 미생물 군집의 3.3%를 차지하고 있다. 또한
131 배양된 메탄생성균은 고세균의 0.7%만을 차지하고 있는 것으로 보고되었다[9]. 수소를
132 이용하는 주요 메탄생성균으로는 *Methanobrevibacter* 속에 속하며 이는 두개의 그룹으로
133 나뉘어 SGMT 계통군인 *Mbb. smithii*, *Mbb gottschalkii*, *Mbb millerae* 및 *Mbb thaueri* 계통과
134 RO 계통군으로 *Mbb, ruminantium* 및 *Mbb olleyae* 이 있으며, 또 다른 수소 이용 메탄균으로는
135 *Methanosphaera*, *Methanimicrococcus* 및 *Methanobacterium* 이 있다. 이 중 SGMT
136 계통군(clade)은 메탄 생성량과 양의 상관관계가 있는 것으로 보고되고 있다[10,11]. 반추위에
137 존재하는 메탄생성균은 품종에 따라 우점종이 각기 다르게 나타나는데, 섬유질 배합사료를
138 먹인 젖소의 반추위에는 *Methanobrevibacter ruminantium* 이 우점하며 그 다음으로는
139 *Methanosphaera stadtmanae* 가 우점하는 것으로 밝혀졌다. 또한 메탄생성균과 사료의

140 품질간의 연계성을 보면 고에너지 사료를 급여한 축우에서 *Methanobrevibacter smithii* 가
141 우점하고 있으며, 에너지 함량이 낮은 사료에서 주로 *Methanobrevibacter ruminantium* 이
142 우점하는 것으로 알려져 있다[12].

143 탄수화물의 조성은 반추위 pH 에 영향을 미치며 결과적으로 반추위내 미생물군과 메탄
144 발생량에 변화를 줄 수 있다. 또한 섬유질 함량이 많은 조사료의 함량이 높을 수록 전체 메탄
145 발생량은 증가하게 되며, 쉽게 분해되는 전분 성분이 많은 사료와 가용성 탄수화물의 함량이
146 높을 수록 pH 감소와 프로프온산 형성을 촉진하여 메탄 생성량은 감소한다. 지방은 메탄
147 생성량에 미비한 영향을 미치나 지방 1%당 메탄 저감율은 소에서 3.77%의 감소효과가 있으며,
148 지방산중 C12:0, C18:3 및 다중 불포화지방산은 대체적으로 포화지방산보다 메탄 감소효과가
149 우수한 것으로 보고되었다[13]. 지방산의 메탄 저감 효과를 높이기 위해 단일 지방산보다는
150 혼합한 지방 화합물이 더욱 효과적인 것으로 알려져있으며, 라우릭산, 아마인유 및 칼슘
151 류마릭산을 혼합하여 급여시 메탄 저감효과는 더욱 증가하였다. 사료내 지방의 함량을 높일
152 수록 반추위 메타노젠의 다양성과 대사 활동이 감소하며, 전체적인 미생물의 종 구성이
153 변화된다[14]. 사포닌, 탄닌, 플라보노이드 및 에센셜 오일과 같은 식물의 2차 대사산물은
154 반추위 미생물에 대하여 항균 활성을 가지고 있으며, 이에 일부 식물 2차대사산물은 반추위내
155 메탄균의 억제와 더불어 메탄의 배출을 완화시키는 데 도움을 주는 것으로 보고되었다. 특히
156 *Methanobacteriales*, *Thermoplasmata* 고세균 등은 축합형 탄닌을 급여시 영향을 받는 것으로
157 알려져 있으며[15]. 정향, 유칼립투스 및 페퍼민드와 같은 에센셜 오일도 고세균과
158 프로토조아의 성장을 억제하며 간접적으로는 수소를 생산하는 박테리아의 억제를 통해
159 직간접적으로 메탄의 억제가 된다[16].

160

161

메탄 저감 연구 동향

162 **사료효율과 메탄발생량**

163 사료가 반추위 발효 조절에 영향을 미치는 주요 요인은 사료섭취량, 사료의 소화율, 휘발성
164 지방산을 포함하는 최종 발효 산물 및 pH 변화가 주요 핵심 요소라 할 수 있다. 한 예로
165 사료효율을 개선하여 국내 한우의 비육기간을 28개월 단축할 경우 2018년 사육마릿수 및
166 출하월령대비 약 2만톤의 온실가스를 감축할 수 있는 것으로 분석되었다. 또한 출하월령을
167 26개월로 단축시 약 3만 8천톤의 온실가스 감축효과가 있는 것으로 나타났다[17]. 비육우의
168 사육기간 단축을 위해서는 사료 효율 개선 및 가축 개량 등 가축의 생산성을 향상하기 위한
169 다양한 방안들이 제시되어야 하며, 가축의 증체 및 사육기간 단축을 위한 방안으로 사료의
170 효율을 높이는 것은 매우 중요하다. 사료 효율을 높이는 것은 메탄 발생량을 조절할 수 있는
171 방안으로, 반추가축의 사료효율 및 메탄 배출에 대한 다양한 연구들이 진행되어왔다. 최근에는
172 메탄 배출량, 반추위 미생물 군집 변화 및 사료 이용 효율과의 연계성을 함께 분석하는
173 다각적인 검토가 이루어지고 있다. 일반적으로 반추위 메탄 발생량은 건물섭취량, 소화 가능한
174 유기물 섭취량, 사료의 조성, 반추위 미생물, 휘발성 지방산, 동물의 유전적 특성 및 환경요인에
175 의해 영향을 받는다. 한 예로 사료 효율은 섭취한 사료를 영양소로 전환하는데 반추가축의
176 능력에 따라 달라지며, 소화율이 낮은 사료나 섬유질 함량이 높은 사료를 급여하였을 때 메탄
177 발생량은 증가한다. 그러나 반추위 미생물 군집의 차이가 최종 발효산물 및 메탄 배출과는
178 유의적인 관련이 없는 것으로 보고되고 있으며[18], 다만 휘발성 지방산의 비율은 반추위
179 미생물 군집에 의해 영향을 받을 가능성이 높다. 사료원에 따른 메탄 발생량을 비교한
180 메타분석에 따르면 건물섭취량과 메탄배출량은 $R^2=0.8$ 으로 선형 관계를 나타내며, 전분의
181 함량이 높은 사료를 급여할 경우 반추위내 전분 분해 박테리아와 젖산염을 활용하는 균수가
182 증가하므로 메탄생성균과 수소의 이용 효율이 높아 메탄 발생량이 감소하는
183 상관관계($R^2=0.76$)를 나타냈다. 또한 사료내 NDF 함량과 메탄의 배출량은 유의한 상관관계를
184 보이지 않으나[19], 전분 및 NDF 성분은 젖소의 주요 에너지 공급원으로 전분/NDF 비율이
185 증가함에 따라 메탄 발생량은 감소하는 선형적인 관계를 나타냈다($R=0.76$). 전분 및 NDF 의

186 비율이 증가함에 따라 젖소가 유생산에 필요한 에너지 공급을 증가시키면 우유 생산량도
187 증가된다. 그러나 전분/NDF 의 비율이 0.72를 초과하게 되면 과도한 젖산 생산으로 반추위
188 pH 가 감소하고, 섬유질을 분해하는 박테리아의 수가 감소하여 우유 생산량에도 영향을 받는다.
189 젖소에서는 사료 급여 방법에 따라 메탄발생량을 감소시킬 수 있는 것으로 알려져 있다. 오일,
190 두과작물, 옥수수 사일리지 및 농후 사료 함량을 증가시킬 경우 적게는 5%에서 20%까지 메탄
191 저감이 예상되는 것으로 나타났으며[20], 특히 농후 사료의 첨가 비율은 최소 35-40% 이상
192 되어야 메탄 저감효과가 나타난다. 또한 사료의 가공방법에 따라 메탄 발생량이 영향을
193 받으며(Fig. 1), 조사료 및 단미사료를 분쇄하거나 펠릿화 할 경우 사료입자의 반추위 통과율이
194 증가하여 메탄 발생량이 감소하게 된다[21]. 또한 사일리지는 제조 과정에서 젖산 발효 과정을
195 통해 보존성을 높이는 효과뿐만 아니라, 발효 과정중에 생성된 유기산(젖산, 아세트산,
196 프로피온산 및 부티르산)이 부분적인 가수분해를 촉진하고 섬유소와 리그린의 결합을
197 완화시킴으로 소화율 증가와 메탄 발생을 줄일 수 있다. 지방은 메탄 저감을 위한 중요한
198 물질로 중쇄지방산(C12, C14)은 반추위 프로피온산 발효를 촉진하고 프로토조아의 특정한
199 독성을 가지고 있으나, 지방이 메탄 저감효과를 가지려면 최소 2.89-4.86% 이상 첨가할 때 그
200 효과가 있는 것으로 나타났다.

201

202 메탄저감 사료첨가제

203 1979년부터 2018년까지 *in vitro* 배양 실험 조건에서 분석한 사료 첨가제의 메탄 저감효과를
204 나타낸 메타 분석결과에 의하면, 화학적 억제제, 전자 싱크, 에센셜 오일, 사포닌, 탄닌 및
205 식물추출물의 메탄저감효과는 각각 29.2%, 18.9%, 18.2%, 14.8%, 14.5% 및 14.5%로 감소하는
206 결과를 가져왔다. 그러나 미생물, 효소, 조류 및 유기산의 보충은 다양한 실험결과에서 유의적인
207 결과를 나타내지 않았다[22]. 일반적으로 반추위액을 이용하는 실험실에서 진행되는 *in vitro*
208 실험은 동물실험과 비교하여 적은 시간내에 많은 수의 시료와 반복수를 확대할 수 있고,

209 메탄발생량을 측정하는데 강한 상관관계가 있으므로 첨가제의 메탄 저감효과를 예측할 수 있는
210 방안이 되고 있다[23]. 화학억제제로 제안되고 있는 3-니트로오기프로판올(3-NOP)는 동물의
211 생산성에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 최대 30%까지 메탄 저감효과가 있는 것으로
212 분석되었으며[24], 최근 메타 분석에 의하면 건물섭취량, 섬유소 소화율 및 체중증가에 영향을
213 미치지 않고 메탄 완화 효과가 있는것으로 보고되었다[25]. 메탄 저감효과가 있는 사료첨가제를
214 사용할 경우 일부 사료첨가제의 가축에 대한 독성을 고려하여야 한다. 그 예로 B-
215 사이클로텍스트린의 경우 75% 이상의 메탄저감효과가 있는 것으로 보고되고 있으나, 소량의
216 첨가량에서도 독성이 있는 것으로 알려져 있으며[26], 질산염 첨가도 메탄 저감효과가
217 20%정도이나 반추위내 암모니아의 증가 및 질산염 대사의 중간 생성물로 인한 잠재적 독성은
218 고려되어야 할 사항이다.

219

220 **해조류**

221 최근 메탄 저감효과가 우수한 해조류는 홍조류인 Rhodophyta 문에 속하는 *Asparagopsis*,
222 *armata* 및 *Asparagopsis taxiformis* 가 대표적이다. 이 두종은 반추가축 사료에 첨가할 경우
223 사료의 효율을 높이는 동시에 생물학적 활성을 지닌 할로겐 화합물을 포함하고 있으며, 최대
224 98%까지 메탄억제효과가 있는 것으로 나타났다[27,28]. 홍조류에는 항균, 효소 억제 및
225 항산화에 관여하는 다양한 생리활성 화합물이 포함되어 있는 것으로 알려져 있으며, 이중
226 바다고리풀로 불리는 *Asparagopsis* 에는 브롬 화합물(tribromomethane,
227 dibromochloromethane, dibromoacetic acid, bromochloroacetic acid, dibromotromethane
228 등)이 많이 포함되어 있다. 이중 *Asparagopsis armata* 의 bromoform 함량은 1.45-1.67%로
229 금속 효소를 억제하여 메탄 생성을 억제하는 휘발성 물질이며, 특히 메틸 Co-M 환원효소에
230 경쟁적으로 결합하게 해 주는 역할을 한다. 다만 메탄 저감제로 이용 가능성이 높은 홍조류는
231 주요 활성 물질의 독성 문제에 대한 접근이 이루어져야 하며, 홍조류에 포함되어 있는 메탄

232 저감물질인 bromoform 은 상온에서 액체성분으로 존재하지만 흡입, 피부 흡수 및 섭취시
233 중추신경계에 영향을 미친다[29]. 또한 일부 연구에서는 건물섭취량 1kg 당 바다고리풀을 1%
234 이상 고용량을 사용 할 경우에는 사료의 섭취량 및 우유 생산량이 감소하는 것으로
235 나타났다[30]. 따라서 홍조류 종인 바다고리풀을 사용시에는 주요 활성 물질의 독성 및 사료내
236 첨가량 등 안전성에 대한 문제를 고려해야 한다. 또한 할로겐 화합물이나 기타 천연 물질에
237 포함된 할로겐 물질은 오존 파괴, 우유나 고기와 같은 육류 제품내의 잔류물, 동물 건강 등의
238 다양한 손상을 일으킬 수 있는 잠재성이 존재함으로[31], 이를 위해 많은 개체수를 이용한
239 추가적인 연구도 수행할 필요가 있다.

240

241 **생균제(DFM, Directed-Fed Microbials)**

242 반추위 미생물 발효조절과 메탄저감을 목적으로 사용하고자 하는 생균제는 화학제제나
243 식물추출물에 비해 안정적이고 유망한 기술로 주목을 받고 있다. 미생물제제는 비교적 저렴한
244 생산비용과 생산성을 개선하는 효과로 인해 많은 연구자들의 주목을 받아왔다 [32,33]. 현재
245 국내에서 보조사료로 이용하는 미생물제제는 30여종 이상이나 대부분 성장 촉진 및 장내 발효
246 조절을 목적으로 사용하고 있으며, 메탄 저감을 위한 제제는 *in vitro* 실험 여건에서는 효과가
247 있으나 동물실험에서 지속적인 효과를 나타내지 못하여 여전히 논란의 여지가 있다. 한 예로
248 효모(*Saccharomyces cerevisiae*)가 소의 메탄 감소에 미치는 영향을 조사한 메타분석에서는
249 메탄 배출 및 메탄 저감효과가 미비한 것으로 나타났다[34]. 또한 가축에서 많이 사용하는
250 유산균은 발효 품질을 개선하기 위한 목적으로 많이 사용되며, 특히 사일리지 제조과정에서
251 저장성 개선 및 소화율 등을 위한 품질 향상을 목적으로 많이 사용하고 있다. 유산균은
252 발효과정가운데 2차 대사산물로 젖산, 아세트산, 에탄올, 프로피온산과 같은 발효생성물이
253 만들어진다. 이들 물질은 병원균의 성장을 억제할 뿐만 아니라 사일리지와 반추위내
254 프로피온산 생성을 통해 메탄 감소에 영향을 미치는 것으로 나타났다[35]. *Enterococcus* 종은 *in*

255 *vitro* 상에서 메탄 발생량을 20.3% 감소시켰으며, 총 휘발성 지방산과 초산에는 영향을 미치지
256 않았으나 프로피온산이 감소하고 낙산은 25.7% 증가한 것으로 나타났다. 그러나 프로피온산을
257 생산하는 미생물이나 유산균도 사료에 급여하였을 때 동물 실험에서 메탄 저감 효과는
258 나타나지 않는 것으로 보고되었으며, 지금까지의 연구에서는 전체적으로 5% 미만이
259 저감효과가 있는 것으로 메타분석을 통해 보여주고 있다. 최근 온실가스 저감을 위한 연구에서
260 메탄영양세균(*Methanotrophic bacteria*)은 메탄을 탄소 및 에너지원으로 활용하는 독특한
261 특징을 가지고 있으며, 이 세균은 methylotrophic 균의 하위그룹으로 강, 논, 토양 및 슬러지 등
262 여러 환경에서 살고 있다. 논과 같은 자연환경에서는 메탄 생산, 산화 및 배출과정을 통해
263 메탄이 전환되는데, 생산된 메탄의 많은 부분이 메탄영양세균에 의해 분해되는 것으로
264 보고되어 있어 반추 가축에서의 메탄영양세균에 의한 메탄 저감 효과를 연구할 필요성이
265 있다[36]. 또한 미생물제를 급여할 때 메탄 저감효과에 대한 다양한 결과는 사료의 구성,
266 실험기간, 동물의 품종 등과 같은 다양한 변수에 따라 다르게 나타날 수 있으므로, 미생물
267 급여에 따른 효과가 발생하기 위해서는 체계적인 연구 설계와 많은 추가 연구가 필요하다.

268

269 화학적 첨가제

270 표적 물질을 대상으로 하는 화학적 첨가제의 개발은 오랜 기간을 통해 연구가 진행되어 왔다.
271 그 중에서 반추위 메타생성균을 억제하는 3-NOP(3-니트로옥시프로판올)는 메탄 생성의 마지막
272 단계를 촉매하는 methyl-coenzyme M reductase 활성부위에서 작용한다. 본 물질은 메탄
273 억제간의 선형적인 관계를 보이며, 반추위내 일일 메탄 배출량의 32.5%를 감소시킨다. 3-
274 NOP 의 항메탄 생성 효과는 우선적으로 제제의 용해도가 높아 반추위내 체류 시간이 짧은
275 것으로 알려져 있기때문에, 하루에 1-2회 정도 지속적으로 급여할 수 있는 급여시스템이
276 필요한 것으로 나타났다[37]. 또한 반추위내 에너지 밀도가 높은 프로피온산의 증가를 가져오는
277 반면에 과잉의 수소(H₂)가 생성되는 특성을 지니고 있다.

278 화학제제로서 질산염 보충은 반추위내 메탄 저감 효과가 있는 것으로 알려져 있다(Table 2).
279 특히 질산염을 보충할 경우 반추위내 수소 이용성을 감소시키고, 메탄생성균을 포함한
280 *Selenomonadales* 및 *Campylobacteriales* 계통균에 영향을 줌으로써 메탄저감효과가 나타나는
281 것으로 보고 되고 있다. 질산염은 이전 실험 결과에서 2.1-3.04%까지 급여하였을 때 우유 생산,
282 사료섭취량 및 체중 증가에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그러나 일부 연구에서 메탄
283 생성을 줄이기 위하여 많은 양의 질산염을 사용하면 암모니아로 불완전한 환원이 되어
284 반추위벽을 통해 질산염과 아질산염이 혈액으로 흡수되며, 혈액내 아질산염은 헤모글로빈과
285 결합하여 메트 헤모글로빈으로 전환함으로 질산염 중독의 원인이 될 수 있다. 또한 일부 분뇨로
286 배출되면 암모니아 및 아산화질소로 전환되어 분뇨내 온실가스 증가 원인이 될 수도 있으며,
287 질산염 중독은 사료 섭취, 생산량 감소, 호흡 불량, 청색증 및 폐사 등 여러 질환의 원인이 될 수
288 있다. 따라서 질산염 공급 시에는 반추위내 분해 속도를 낮추거나, 지속적으로 적응시킴으로
289 독성의 위험을 낮추는 방안도 제시되고 있다.

290 카르복실산 폴리 에스테르 이온 운반체인 모넨신은 그람 양성균을 억제할 뿐만 아니라
291 프로피온산을 향상시키는 제제로 축우에서 사용되며, 지속적으로 사용된 모넨신의 메탄 저감
292 효과는 여러 논문을 통해 잘 나타나고 있다. 메타 분석에 따른 모넨신의 메탄 저감량은 일일
293 17.5g 감소하는 것으로 나타나며, 사료 1kg 당 23-44g 을 사용할때 일일 25.6g 감소되는 것으로
294 나타났다[38].

295

296 식물성 사료첨가제

297 식물성 추출물 및 식물성 사료첨가제는 성장 촉진용 항생제와 유사한 특성을 가지고 있으며,
298 다양한 생물학적 활성을 가지는 복합 화합물의 특성을 가지는 물질이다[39]. 에센셜 오일과
299 같은 식물 추출물이나 허브 추출물은 성장이나 사료 효율에 부정적인 영향을 주지 않으면서
300 항균, 항산화, 항염증 및 면역 활동에 유익한 효과를 주며, 화학 제제에 비해 부작용이 적은

301 점이 장점으로 제시되고 있다. 식물 첨가제의 주요 유효성분으로는 글루코사이드, 폴리페놀,
302 다당류, 테르페노이드, 알칼로이드 및 플라보노이드 등의 있으며, 주요 2차 활성 대사산물로는
303 알칼로이드, 배당체, 페놀산, 사포닌, 탄닌, 테르펜 및 스테로이드 등이 포함된다. 이들 물질들은
304 다양한 추출 및 정제 방법을 통해 분리하여 기능에 맞는 첨가제로 사용되고 있다 (Fig 2).

305 반추가축에서 특정 성분의 식물 추출물과 복합 식물 첨가물은 반추위 발효 개선 및
306 암모니아를 억제하고 메탄을 저감하는 목적으로 사용되며[40], 그 중 탄닌, 사포닌, 에센셜 오일
307 및 폴리페놀은 반추위 발효 조절 및 메탄을 억제하는 것으로 나타났다[41,42]. 식물추출물의
308 주요 기능으로는 그람 음성균과 양성균에 대한 광범위한 항균 작용을 나타내는 것이며, 주요
309 병원성 미생물인 *Salmonella aureu*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Escherchiia coli*,
310 *Stapylococcus aureus* 및 *Pseudomonas aeruginosa* 등에 대하여 항균 활성을 가지고 있다[43].
311 식물추출물에 포함된 대부분의 활성 물질은 소수성으로 세균의 세포막과 인지질의 이중층
312 구조를 손상시켜, 막 투과성을 증가시킴으로 삼투압 조절과 세포 대사과정을 중지시키거나
313 DNA 또는 RNA polymerase 의 활성을 억제하는 것으로 알려져 있다[44]. 이외에도 면역 조절과
314 항산화 활성을 가지고 있는 다양한 식물 활성 추출물은 장내 미생물 균총 조절에도 기여한다.
315 그 중 마늘, 페퍼민트 및 폴리페놀이 함유된 물질들은 박테리아의 다양성을 증가시키고,
316 *Salmonella spp.*, *Escherchiia coli* 및 *Campylobacter* 를 포함한 병원성 세균의 수를 감소시킨다.
317 또한 상업용 제품인 Mootral 에 포함된 마늘 분말과 감귤 분말 혼합물은 프로피온산 생성을
318 증가시키고 수소 생산 박테리아를 감소시키며[45], 에센셜 오일-코발트 및 약초 혼합물은
319 반추위 발효 및 고세균 군집을 조절하여 메탄과 암모니아를 감소시키는 효과를
320 가져왔다[46,47].

321 캐슈넛 껍질액(CNSL, Cashew Nut Shell Liquid)은 캐슈넛 생산에서 나오는 부산물로 항균
322 활성을 가진 페놀성 화합물인 아나카르드산, 카르다놀 및 카르돌이 포함되어 있으며,
323 아나카르드산이 주요 성분이다. 이 물질은 미생물의 세포벽을 파괴하는 계면활성제 활성을

324 나타내며, 더불어 프로피온산 생산을 증진시켜 메탄을 감소시키는 데 작용한다. 젖소에서
325 CNSL 을 급여할 경우 메탄 배출이 최대 38%(CH₄ g/kg DMI)까지 감소하였으며, 주요 메탄균인
326 *Methanobrevibacter* 의 풍부도가 감소하였다. CNSL 의 사용도 화학 제제와 마찬가지로 주요
327 성분인 아나카르드산이 안정성 및 효과를 높이기 위해서는 메탄 저감 효과가 있는 물질과의
328 혼합 사용도 고려할 필요가 있다[48,49].

329

330

가축의 유전적 개량

331 반추 가축의 메탄 완화를 위한 전략 중 메탄을 적게 배출하는 가축을 선발하는 방안은 축산
332 농가의 비용 절감과 향후 지속 가능한 축산 환경 구축 및 기후 변화에 대응하는 방법으로
333 제시되고 있다. 메탄 발생량이 적은 반추 가축을 생산하려면 장내 메탄 배출이 낮은 유전적
334 잠재능을 가진 동물을 선발하여야 하며, 반추 가축 중에 젖소는 일일 약 426-463g 의 메탄을
335 생산하는 것으로 보고된다[50]. 젖소는 메탄 생성과 관련하여 중간 정도의 유전성을 가지고
336 있는 것으로 나타났으며, 유전적인 측면에서 메탄 생산량은 약 0.12-0.45까지 유전될 수 있기
337 때문에 젖소를 선발하는데 유전 육종 방법을 사용하는 것은 지속적인 낙농 산업을 유지하기
338 위한 수단이 될 수 있다[51]. 젖소의 메탄 배출량 추정치에 대한 유전력은 착유 기간 동안
339 다양하여 비유초기에는 0.23에서 비유중기에는 0.3으로 상승하고 후기 0.27로 나타나며 평균
340 유전율은 약 0.27로 다양한 것으로 보고 되고 있다[52]. 캐나다에서는 2023년부터 젖소 품종에
341 대하여 유생산에 영향을 주지 않고, 메탄 배출이 적은 개체를 선발하기 위한 평가 방법이
342 시행되었다. 본 유전자 평가 모델에는 우유 생산량, 지방 생산량 및 단백질 생산량과 함께 메탄
343 발생량에 대한 상관 관계를 고려한 평가 모델이 사용되었다. 젖소의 생산성을 중심으로 한 개량
344 방법 외에도 소의 게놈 정보를 활용한 가축의 선발도 대안이 될 수 있다. 이는 최근 연구에서
345 메탄 생산과 관련된 가변성 다유전적 특성이 입증되고, 단일 뉴클레오타이드 다형성 및 메탄
346 특성과 관련된 후보 유전자가 보고되고 있다[53,54]. 젖소에서 발생하는 메탄 측정은

347 일반적으로 스니퍼(Sniffer) 방식을 활용한 측정 방법이 많이 사용되며, 이 방식은 착유중인
348 젖소로부터 방출되는 메탄 가스를 직접 측정하는 방법이다. 젖소의 코와 입 주변에서 가까운
349 위치에 기계를 설치하여 메탄과 이산화탄소의 농도를 동시에 측정하는 방식으로, 다수의 착유
350 중인 젖소의 메탄 발생량을 측정할 수 있다. 이외에도 젖소의 선발에 적외선 분광법(MIR, Mid-
351 infrared 또는 Fourier Transform MIR) 방법을 통해 메탄 발생량을 예측하는 연구도 진행된 바
352 있으며, 적외선 분광법은 우유의 성분을 분석하는 기술로 적외선은 분자의 진동에너지를
353 흡수하는 특성을 가지고 있다. 이를 이용하여 우유 MIR 은 우유, 지방, 단백질 생산량, 계절,
354 연령 및 착유 일수를 주요 변수로 포함하여, 다양한 요인들을 메탄발생량과 연결하여 메탄
355 효율성이 높은 개체를 선발하고 정량적으로 분석할 수 있다[55].

356

357

결론 및 향후 과제

358 반추 가축은 식량 안보와 인간의 정상적인 영양 균형을 위한 중요한 공급원으로서, 우리가
359 생산하는 고기 및 우유는 고품질 단백질과 필수 미네랄 및 비타민의 주요 공급원으로 이용되고
360 있다. 또한 반추 동물의 장점은 사람이 이용하지 않는 조사료와 부산물을 사료로 사용할 수
361 있다는 이점이 있다. 반추 가축을 생산하기 위한 영양 대사 과정 중에 발생하는 메탄은
362 반추위의 대사과정에서 생성되는 정상적인 발효 산물이다. 또한 반추동물의 고기와 우유
363 단백질을 생산하기 위한 탄소 발자국은 일반적으로 식물성 단백질에 비교하여 탄소발자국이
364 높은 것으로 알려져 있으나, 아미노산의 품질을 고려하면 탄소 발자국은 최대 40%까지
365 감소되는 것으로 나타났다[56].

366 국가별 환경 규제가 점차 강화됨에 따라 우리 축산업은 지속적인 혁신과 개선을 외부로부터
367 강요 받고 있으며, 지구 환경을 보존하는 측면에서 온실가스와 암모니아 배출을 줄이는 것은
368 기본적인 의무가 되어가고 있다. 그 중 주요 온실가스인 메탄 배출을 완화하는 것은 지구
369 온난화를 감소시킬 수 있는 방안으로, 2000년 이후 반추 가축의 장내 메탄을 줄이기 위한

370 연구가 수십년 동안 진행되고 있다. 다년간의 연구를 통해 반추 가축의 메탄 저감을 위한
371 다양한 노력은 상당한 진전을 이루었으며, 대부분의 개발된 저감제는 반추위에 존재하는
372 메탄생성균을 표적으로 삼거나 발생하는 수소의 이용을 개선시키는 방향으로 진행되어 왔다.
373 또한 최근에는 반추위에 발생하는 메탄을 이용하는 미생물에 의해 저감시키는 방안도 새로운
374 대안으로 제시되고 있다.

375 이처럼 반추 가축에서 발생하는 메탄 저감을 위한 다양한 방안이 제시 될 필요가 있으며,
376 효과적인 메탄 감축을 위해서는 여러 기술을 접목해야 한다. 하지만 메탄 저감제의 개발과
377 더불어 안전성 확보가 최근 해결해야 할 문제이며, 이는 동물과 인간의 건강을 위하여
378 우선적으로 고려되어야 한다. 안전성 확보를 위한 단계적 독성 실험, 사용 기준 및 제한에 대한
379 기준을 마련하고 안전 사용에 대한 지침도 제공해야 할 것이며, 안전하고 지속적인 환경
380 친화적인 가축 생산을 위해서는 연구자, 축산농가 및 사료 회사가 모두 함께 노력해야 한다.

381

382

383 감사의 글

384 본 논문은 농림식품기술기획평가원의 지원(RS-2023-00231662)에 의해 수행되었습니다.

385

386

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

References

1. National Institute of Animal Science. Feed Process Review Committee Operating Regulations. 2023.
2. IPCC. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. 2023.
3. Greenhouse Gas Inventory and Research Center of Korea. 2021 National Greenhouse Gas Inventory Report of Korea. 2022.
4. Anderson KL, Nagaraja TG, Morrill JL, Avery TB, Galitzer SJ, Boyer JE. Ruminant Microbial Development in Conventionally or Early-Weaned Calves. *J Anim Sci.* 1987;64:1215–26.
5. Morgavi DP, Cantalapiedra-Hijar G, Eugène M, Martin C, Nozière P, Popova M, et al. Review: Reducing enteric methane emissions improves energy metabolism in livestock: is the tenet right? *Animal.* 2023;17:100830.
6. INRA. INRA feeding system for ruminants. Wageningen Academic Publishers; 2018.
7. Orpin CG. Fungi in ruminant degradation. *Agric Sci Semin Degrad plant cell wall Mater London Agric Res Counc.* 1981. p. 129–50.
8. Kittelmann S, Pinares-Patiño CS, Seedorf H, Kirk MR, Ganesh S, McEwan JC, et al. Two Different Bacterial Community Types Are Linked with the Low-Methane Emission Trait in Sheep. *PLoS One. Public Library of Science;* 2014;9:e103171.
9. Patra A, Park T, Kim M, Yu Z. Rumen methanogens and mitigation of methane emission by anti-methanogenic compounds and substances. *J Anim Sci Biotechnol.* 2017;8:13.
10. Snelling TJ, Genç B, McKain N, Watson M, Waters SM, Creevey CJ, et al. Diversity and Community Composition of Methanogenic Archaea in the Rumen of Scottish Upland Sheep Assessed by Different Methods. *PLoS One. Public Library of Science;* 2014;9:e106491.
11. Kittelmann S, Seedorf H, Walters WA, Clemente JC, Knight R, Gordon JJ, et al. Simultaneous Amplicon Sequencing to Explore Co-Occurrence Patterns of Bacterial, Archaeal and Eukaryotic Microorganisms in Rumen Microbial Communities. *PLoS One. Public Library of Science;* 2013;8:e47879.
12. Zhou M, Chung Y -H., Beauchemin KA, Holtshausen L, Oba M, McAllister TA, et al. Relationship between rumen methanogens and methane production in dairy cows fed diets supplemented with a feed enzyme additive. *J Appl Microbiol.* 2011;111:1148–58.
13. Patra AK. The effect of dietary fats on methane emissions, and its other effects on digestibility, rumen fermentation and lactation performance in cattle: A meta-analysis. *Livest Sci.* 2013;155:244–54.
14. Patra AK, Yu Z. Effects of coconut and fish oils on ruminal methanogenesis, fermentation, and abundance and diversity of microbial populations in vitro. *J Dairy Sci.* 2013;96:1782–92.
15. Saminathan M, Sieo CC, Gan HM, Abdullah N, Wong CMVL, Ho YW. Effects of condensed tannin fractions of different molecular weights on population and diversity of bovine rumen methanogenic

- 421 archaea in vitro, as determined by high-throughput sequencing. *Anim Feed Sci Technol.*
422 2016;216:146–60.
- 423 16. Cobellis G, Trabalza-Marinucci M, Yu Z. Critical evaluation of essential oils as rumen modifiers in
424 ruminant nutrition: A review. *Sci Total Environ.* 2016;545:556–68.
- 425 17. Lee Y, Kim H, Seung J. Research on Greenhouse Gas Reduction Measures at the Livestock
426 Production Stage to Achieve Carbon Neutrality. Korea Rural Economic Institute; 2023 Oct.
- 427 18. Cabezas-Garcia EH, Krizsan SJ, Shingfield KJ, Huhtanen P. Between-cow variation in digestion and
428 rumen fermentation variables associated with methane production. *J Dairy Sci.* 2017;100:4409–24.
- 429 19. Zhang C, Jiang X, Wu S, Zhang J, Wang Y, Li Z, et al. Journal Pre-proof Dietary fat and
430 carbohydrate-balancing the lactation performance and methane emissions in the dairy cow industry:
431 a meta-analysis. *Anim Nutr J.* 2024;
- 432 20. Beauchemin KA, Tamayao P, Rosser C, Terry SA, Gruninger R. Understanding variability and
433 repeatability of enteric methane production in feedlot cattle. *Front. Anim. Sci.* . 2022.
- 434 21. Hales KE, Cole NA. Hourly methane production in finishing steers fed at different levels of dry
435 matter intake. *J Anim Sci.* Oxford University Press; 2017;95:2089–96.
- 436 22. Martins LF, Cueva SF, Lage CFA, Ramin M, Silvestre T, Tricarico J, et al. A meta-analysis of
437 methane-mitigation potential of feed additives evaluated in vitro. *J Dairy Sci.* Elsevier;
438 2024;107:288–300.
- 439 23. Danielsson R, Ramin M, Bertilsson J, Lund P, Huhtanen P. Evaluation of a gas in vitro system for
440 predicting methane production in vivo. *J Dairy Sci.* 2017;100:8881–94.
- 441 24. Hristov AN, Melgar A, Wasson D, Arndt C. Symposium review: Effective nutritional strategies to
442 mitigate enteric methane in dairy cattle. *J Dairy Sci.* 2022;105:8543–57.
- 443 25. Arndt C, Hristov AN, Price WJ, McClelland SC, Pelaez AM, Cueva SF, et al. Full adoption of the
444 most effective strategies to mitigate methane emissions by ruminants can help meet the 1.5 °C target
445 by 2030 but not 2050. *Proc Natl Acad Sci. Proceedings of the National Academy of Sciences;*
446 2022;119:e2111294119.
- 447 26. Mohammed N, Lila ZA, Ajisaka N, Hara K, Mikuni K, Hara K, et al. Inhibition of ruminal microbial
448 methane production by β -cyclodextrin iodopropane, malate and their combination in vitro. *J Anim*
449 *Physiol Anim Nutr (Berl).* John Wiley & Sons, Ltd; 2004;88:188–95.
- 450 27. Kladi M, Vagias C, Roussis V. Volatile halogenated metabolites from marine red algae. *Phytochem*
451 *Rev.* Springer; 2004;3:337–66.
- 452 28. Roque BM, Venegas M, Kinley RD, De Nys R, Duarte TL, Yang X, et al. Red seaweed
453 (*Asparagopsis taxiformis*) supplementation reduces enteric methane by over 80 percent in beef steers.
454 *PLoS One.* Public Library of Science; 2021;16:e0247820.

- 455 29. Hutchings JL, Grebneva Y, Dilmetz SJ, Pincher DWM, Hoffmann P. Analytical methods for the
456 analysis of bromoform in red seaweed *Asparagopsis armata* and *Asparagopsis taxiformis* – A review.
457 *Algal Res. Elsevier*; 2024;79:103478.
- 458 30. Roque BM, Salwen JK, Kinley R, Kebreab E. Inclusion of *Asparagopsis armata* in lactating dairy
459 cows' diet reduces enteric methane emission by over 50 percent. *J Clean Prod. Elsevier*;
460 2019;234:132–8.
- 461 31. Glasson CRK, Kinley RD, de Nys R, King N, Adams SL, Packer MA, et al. Benefits and risks of
462 including the bromoform containing seaweed *Asparagopsis* in feed for the reduction of methane
463 production from ruminants. *Algal Res. Elsevier*; 2022;64:102673.
- 464 32. Alawneh JI, Barreto MO, Moore RJ, Soust M, Al-harbi H, James AS, et al. Systematic review of an
465 intervention: the use of probiotics to improve health and productivity of calves. *Prev Vet Med.*
466 2020;183:105147.
- 467 33. Barreto MO, Soust M, Moore RJ, Olchowy TWJ, Alawneh JI. Systematic review and meta-analysis of
468 probiotic use on inflammatory biomarkers and disease prevention in cattle. *Prev Vet Med.*
469 2021;194:105433.
- 470 34. Jeyanathan J, Martin C, Morgavi DP. The use of direct-fed microbials for mitigation of ruminant
471 methane emissions: a review. *Animal*. 2013/11/25. Cambridge University Press; 2014;8:250–61.
- 472 35. Jalč D, Lauková A, Váradyová Z, Homolka P, Koukolová V. Effect of inoculated grass silages on
473 rumen fermentation and lipid metabolism in an artificial rumen (RUSITEC). *Anim Feed Sci Technol.*
474 2009;151:55–64.
- 475 36. Knief C. Diversity of Methane-Cycling Microorganisms in Soils and Their Relation to Oxygen. *Curr*
476 *Issues Mol Biol*. 2019;33:23–56.
- 477 37. Muetzel S, Lowe K, Janssen PH, Pacheco D, Bird N, Walker N, et al. Towards the application of 3-
478 nitrooxypropanol in pastoral farming systems. *Proc 7th GGAA-Greenhouse Gas Anim Agric Conf*
479 (Iguassu Falls). 2019. p. 81.
- 480 38. Cooke RF, Eloy LR, Bosco SC, Lasmar PVF, de Simas JMC, Leiva T, et al. An updated meta-
481 analysis of the anti-methanogenic effects of monensin in beef cattle. *Transl Anim Sci*. 2024;
- 482 39. Kuralkar P, Kuralkar S V. Role of herbal products in animal production—An updated review. *J*
483 *Ethnopharmacol. Elsevier*; 2021;278:114246.
- 484 40. Groot MJ, Kleijer-Ligtenberg G, Van Asseldonk T, Hansman H. Natural dairy cow health: a guide to
485 keeping your herd healthy with herbs and other natural products. RIKILT; 2011.
- 486 41. Belanche A, Pinloche E, Preskett D, Newbold CJ. Effects and mode of action of chitosan and ivy fruit
487 saponins on the microbiome, fermentation and methanogenesis in the rumen simulation technique.
488 *FEMS Microbiol Ecol. Oxford University Press*; 2016;92:fiv160.

- 489 42. Ma T, Wu W, Tu Y, Zhang N, Diao Q. Resveratrol affects in vitro rumen fermentation, methane
490 production and prokaryotic community composition in a time-and diet-specific manner. *Microb*
491 *Biotechnol.* Wiley Online Library; 2020;13:1118–31.
- 492 43. Iqbal Y, Cottrell JJ, Suleria HAR, Dunshea FR. Gut microbiota-polyphenol interactions in chicken: A
493 review. *Animals.* MDPI; 2020;10:1391.
- 494 44. Mahfuz S, Shang Q, Piao X. Phenolic compounds as natural feed additives in poultry and swine diets:
495 A review. *J Anim Sci Biotechnol.* Springer; 2021;12:1–18.
- 496 45. Ahmed E, Yano R, Fujimori M, Kand D, Hanada M, Nishida T, et al. Impacts of Mootral on methane
497 production, rumen fermentation, and microbial community in an in vitro study. *Front Vet Sci.*
498 *Frontiers Media SA;* 2021;7:623817.
- 499 46. Lei Z, Zhang K, Li C, Jiao T, Wu J, Wei Y, et al. Ruminant metagenomic analyses of goat data reveals
500 potential functional microbiota by supplementation with essential oil-cobalt complexes. *BMC*
501 *Microbiol.* Springer; 2019;19:1–10.
- 502 47. Wang SP, Wang WJ, Tan ZL, Liu GW, Zhou CF, Yin MJ. Effect of traditional Chinese medicine
503 compounds on rumen fermentation, methanogenesis and microbial flora in vitro. *Anim Nutr.*
504 *Elsevier;* 2019;5:185–90.
- 505 48. El-Zaiat HM, Araujo RC, Soltan YA, Morsy AS, Louvandini H, Pires A V, et al. Encapsulated nitrate
506 and cashew nut shell liquid on blood and rumen constituents, methane emission, and growth
507 performance of lambs 1,2. *J Anim Sci.* 2014;92:2214–24.
- 508 49. Watanabe Y, Suzuki R, Koike S, Nagashima K, Mochizuki M, Forster RJ, et al. In vitro evaluation of
509 cashew nut shell liquid as a methane-inhibiting and propionate-enhancing agent for ruminants. *J*
510 *Dairy Sci.* 2010;93:5258–67.
- 511 50. Groupe AGECO. Environmental life cycle assessment of Canadian milk production. 2016 data and
512 results update. Executive Summary. [Internet]. 2018 [cited 2024 Apr 8]. Available from: https://www.dairyfarmers.ca/content/download/6327/56092/version/2/file/LCA_ExecutiveSummary.pdf.
- 515 51. Kamalanathan S, Houlahan K, Miglior F, Chud TCS, Seymour DJ, Hailemariam D, et al. Genetic
516 Analysis of Methane Emission Traits in Holstein Dairy Cattle. *Animals.* 2023.
- 517 52. Pszczola M, Rzewuska K, Mucha S, Strabel T. Heritability of methane emissions from dairy cows
518 over a lactation measured on commercial farms. *J Anim Sci.* Oxford University Press;
519 2017;95:4813–9.
- 520 53. Difford GF, Olijhoek DW, Hellwing ALF, Lund P, Bjerring MA, De Haas Y, et al. Ranking cows’
521 methane emissions under commercial conditions with sniffers versus respiration chambers. *Acta*
522 *Agric Scand Sect A—Animal Sci.* Taylor & Francis; 2018;68:25–32.

- 523 54. Manzanilla-Pech CIV, Stephansen RB, Difford GF, Løvendahl P, Lassen J. Selecting for Feed
524 Efficient Cows Will Help to Reduce Methane Gas Emissions. *Front Genet.* 2022;13.
- 525 55. Oliveira HR, Sweatt H, Narayana S, Fleming A, Shadpour S, Malchiodi F, et al. Symposium Review:
526 Development of genomic evaluation for methane efficiency in Canadian Holsteins. *JDS Commun.*
527 2024;
- 528 56. Mcauliffe GA, Takahashi · T, Beal · T, Huppertz · T, Leroy · F, Buttriss · J, et al. Protein quality as a
529 complementary functional unit in life cycle assessment (LCA). *Int J Life Cycle Assess.*
530 1234;28:146–55.
- 531 57. Van Zijderveld S. Dietary strategies to reduce methane emissions from ruminants.
- 532 58. Li L, Davis J, Nolan J, Hegarty R. An initial investigation on rumen fermentation pattern and methane
533 emission of sheep offered diets containing urea or nitrate as the nitrogen source. *Anim Prod Sci.*
534 2012;52:653–8.
- 535
- 536
- 537

ACCEPTED

Tables

539 Table 1. 반추 가축 장내 발효 및 분뇨의 메탄 배출계수(kg/head/yr)

축종		2023 년 적용배출계수	배출계수 출처
한우	암컷	1 세미만	45
		1 세이상	53
	수컷	1 세미만	43
		1 세이상	61
젖소	1 세미만		33
	1 세-2 세미만		83
	2 세이상		139
육우		53	2006 IPCC 배출계수
양, 염소		5	2006 IPCC 배출계수
젖소	분뇨배출계수	58	2006 IPCC 기본값(북미)
한·육우	분뇨배출계수	1	2006 IPCC 기본값(북미)

542 **Table 2. 질산염 첨가 수준에 따른 젖소에서의 메탄 저감율**

시험기간 (일)	메탄발생량(g kg ⁻¹ DMI d ⁻¹)		질산염 첨가량	메탄 저감율 (%)	참고문헌
	대조구	처리구			
90	19.4	16.2	2.1%	16.5	[57]
54	25.7	16.6	0.88g/kg ⁻¹ BW	34	[58]
92	18.7	12.6	2.7	33	[48]

543

544

ACCEPTED




546

547

Figure 1. 젖소 사료 조성에 따른 반추위 메탄 발생량의 연계성

548



549

550

Figure 2. 식물 추출물의 작용 기전 및 개발